

Le CHR – LR communique

Identification des hybrides de Corneille mantelée *Corvus cornix* x *Corvus corone*

par Xavier Rufay

Le CHR souhaite obtenir des informations plus précises sur les corneilles mantelées observées en Languedoc-Roussillon. En effet, certaines fiches ne permettent pas de distinguer s'il s'agit ou non d'hybrides avec la Corneille noire.

Voici donc une série de photos comparatives entre la Corneille mantelée et les hybrides associés afin de vous aider à discerner les hybrides. **La couleur des sous-caudales est décisive pour les oiseaux les moins évidents.**

Corneille mantelée typique



Un individu adulte typique est très contrasté. Le gris sur les parties inférieures va jusqu'au sous-caudales.

Corneille mantelée x Corneille noire



Sur cet hybride, le contraste n'est pas évident et le gris des parties inférieures s'arrête devant l'insertion des pattes.

Corneille mantelée typique



Oiseau typique. Les sous-caudales sont grises sans taches sombres.

Individu pas évident. Seules les sous-caudales noires permettent de certifier qu'il s'agit d'un hybride.

Corneille mantelée x Corneille noire



Cet oiseau est très contrasté, mais les culottes et les sous-caudales noires sont typiques d'un hybride.

Ci-dessus. La coloration très sombre, le ventre noir ne laissent aucun doute...c'est un hybride !



Ci-dessus. Individu hybride évident, le dos est à peine gris !