

Les espèces soumises à homologation en Languedoc-Roussillon (au 1^{er} janvier 2012)

Cygne de Bewick *Cygnus columbianus bewickii*
Cygne chanteur *Cygnus cygnus*
Oie des moissons *Anser fabalis*
Oie rieuse *Anser albifrons*
Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*
Fuligule milouinan *Aythya marila*
Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*
Harelde boréale *Clangula hyemalis*
Harle piette *Mergellus albellus*
Harle bièvre *Mergus merganser*
Erismature rousse *Oxyura jamaicensis*
Plongeon catmarin *Gavia stellata*
Plongeon imbrin *Gavia immer*
Grèbe jougris *Podiceps grisegena*
Grèbe esclavon *Podiceps auritus*
Puffin fuligineux *Puffinus griseus*
Elanion blanc *Elanus caeruleus*
Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*
Marouette poussin *Porzana parva*
Râle des genêts *Crex crex*
Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*
Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*
Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus*
Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*
Mouette de Sabine *Xema sabini*

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*
Goéland argenté *Larus argentatus*
Goéland pontique *Larus cachinnans*
Goéland marin *Larus marinus*
Sterne arctique *Sterna paradisaea*
Guillemot de Troil *Uria aalge*
Mergule nain *Alle alle*
Hibou des marais *Asio flammeus*
Alouette calandre *Melanocorypha calandra*
Pipit de Richard *Anthus richardi*
Pipit maritime *Anthus petrosus*
Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*
Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*
Hypolaïs ictérine *Hippolaïs icterina*
Fauvette babillarde *Sylvia curruca*
Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata*
Fauvette de Moltoni *Sylvia moltonii*
Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*
Gobemouche nain *Ficedula parva*
Gobemouche à collier *Ficedula albicollis*
Mésange boréale *Parus montanus*
Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes*
Corneille mantelée *Corvus cornix*
Sizerin flammé *Carduelis flammea*
Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*
(50 sp.)

Il convient d'ajouter à la liste ci-dessus :

- les espèces jamais observées en Languedoc-Roussillon ou plus rares que celles mentionnées ci-dessus (à l'exclusion de celles qui figurent dans la liste du CHN), à savoir :

Bernache cravant *Branta bernicla*
Puffin des Anglais *Puffinus puffinus*
Puffin majeur *Puffinus gravis*
Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa*
Fulmar boréal *Fulmarus glacialis*
Gélinotte des bois *Bonasa bonasia*
Tétras lyre *Tetrao tetrix*
Perdrix bartavelle *Alectoris graeca*
Bécasseau violet *Calidris maritima*
Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*

Sterne de Dougall *Sterna dougallii*
Ganga cata *Pterocles alcata*
Chevêchette d'Europe *Glaucidia passerinum*
Pic cendré *Picus canus*
Pic tridactyle *Picoides tridactylus*
Alouette haussecol *Eremophila alpestris*
Jaseur boréal *Bombicilla garrulus*
Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus*
Linotte à bec jaune *Carduelis flavirostris*
Bruant lapon *Calcarius lapponicus*

- les sous-espèces occasionnelles dans la région comme par exemple :

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* (une photo ou une description précise du croupion est exigée pour les individus de type femelle/1^{er} hiver d'identification très délicate)
Pouillots véloces de type « sibérien » *Phylloscopus collybita tristis/fulvescens* (seules des photographies et/ou des notes de terrain détaillées sont demandées pour ces taxons **qui ne seront pas soumis à homologation**)
Pie-grièche à tête rousse ssp badius *Lanius senator badius*

- les espèces exotiques s'établissant en France et celles dont l'origine sauvage n'est pas clairement établie : elles ne seront pas soumises à homologation ; il est demandé aux observateurs de transmettre leurs données au CHR sans rédiger de fiche, mais en joignant une photo lorsque cela est possible,

- des espèces dont la date ou le lieu d'observation sont atypiques ou dont l'identification peut être délicate à une certaine époque de l'année (liste non exhaustive) :

Cormoran de Desmarest *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* (hors Pyrénées-Orientales)
Bondrée apivore *Pernis apivorus* (de novembre à mars)
Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* (en décembre et janvier)
Guifette noire *Chlidonias niger* (en décembre et janvier)
Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* (de juillet à mars)
Sterne pierregarin *Sterna hirundo* (en décembre et janvier)
Petit-duc scops *Otus scops* (de novembre à février)
Martinet pâle *Apus pallidus* (hors de la zone littorale située au sud de Sète)
Torcol fourmilier *Jynx torquilla* (en décembre et janvier)

Pic mar *Dendrocopos medius* (hors Lozère)
Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* (hors Aude et Pyrénées-Orientales)
Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (en décembre et janvier)
Pie-grièche à poitrine rose *Lanius minor* (hors Aude et Hérault)
Pie-grièche grise *Lanius excubitor* (hors Lozère)
Corbeau freux *Corvus frugilegus* (hors Gard et Hérault)
Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* (hors d'une zone littorale comprise entre le nord de l'étang de La Palme et le sud de l'étang de Leucate).